

レジメン名	CDDP + VP-16
対象疾患名	小細胞肺がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	高度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食 硫酸Mg	500mL 10mEq	点滴静注	1時間	day 1
2	アクチット フロセミド注	500mL 20mg		1時間	
3	アロキシ注 デキサート注	0.75mg 50mL 9.9mg		15分	
4	生食 シスプラチン(CDDP)注	500mL 60mg/m <sup>2</sup>		1時間	
5	生食	50mL		5分	day 8, 15
6	生食 デキサート注	50mL 9.9mg		15分	
7	生食 エトポシド(VP-16)注	500mL 100mg/m <sup>2</sup>		1時間	
8	生食	50mL		5分	
9	ソルラクト	500mL		1時間	
10	アクチット	500mL		1時間	day 1, 8, 15
11	アプレピタントCap	125mg 1C	内服	投与前	day 1
12	アプレピタントCap	80mg 1C		投与翌日	day 2, 3
13	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼			day 2-4

#### 【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、倦怠感、発熱、口内炎、脱毛、骨髄抑制、肝障害、腎障害、浮腫、電解質異常、神経障害(末梢神経障害、聴力障害)

#### 【その他注意事項】

●CDDP: 腎障害予防として、飲水指導を実施(OS-1を推奨)。