

レジメン名	CBDCA + CPT-11
対象疾患名	小細胞肺がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	グラニセトン注 デキサート注	1mg 50mL 9.9mg	点滴静注	15分	day 1, 8
2	ブドウ糖 カルボプラチン (CBDCA)注	250mL AUC = 6		1時間	day 1
3	ブドウ糖	50mL		5分	
4	ブドウ糖 イリノテカン (CPT11)注	500mL 50mg/m <sup>2</sup>		90分	day 1, 8
5	ブドウ糖	50mL		5分	
6	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼	内服	投与翌日	day 2, 3

**【主な副作用】**

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、脱毛、骨髄抑制、肝障害、末梢神経障害、過敏症、発熱、発疹

**【その他注意事項】**

●CPT-11: コリン様症状(発汗等)に注意。抗コリン薬(ブスコパン等)の使用考慮。腸閉塞、大量腹水・胸水、黄疸、肺線維症には禁忌。CYP3A4阻害・誘導薬、グレープフルーツジュース、St.ジョーンズワートと相互作用あり。