

レジメン名	CBDCA + VP-16 + テセントリク
対象疾患名	小細胞肺がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日	
1	生食	50mL	点滴静注	5分	day 1	
2	生食 テセントリク注	250mL 1200mg		初回60分 2回目～30分		
3	生食	50mL		5分		
4	アロキシ注 デキサート注	0.75mg 50mL 6.6mg		15分	day 1-3	
5	ブドウ糖 カルボプラチン (CBDCA)注	250mL AUC = 5		1時間	day 1	
6	生食	50mL		5分	day 1-3	
7	生食 エトポシド (VP-16)注	500mL 100mg/m <sup>2</sup>		1時間		
8	生食	50mL		5分		
9	アプレピタントCap	125mg 1C		内服	投与前	day 1
10	アプレピタントCap	80mg 1C			投与翌日	day 2, 3

※day 2, 3の前投薬はデキサートのみ

【化学療法による主な副作用】 悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、発熱、脱毛、骨髄抑制、肝障害、腎障害、末梢神経障害、過敏症、発熱、発疹

【免疫療法による主な副作用】 間質性肺炎、大腸炎、肝障害、腎障害、皮膚障害、甲状腺機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、重症筋無力症、神経障害、Infusion reaction

【その他注意事項】

●テセントリク: 施行前に必要な検査を行う。胸部XP、心電図、造影CT検査も実施する。  
ルーチンの採血検査 + 以下の検査を1～3ヶ月ごとに施行する。

- 間質性肺炎: KL-6 SP-D 胸部CT
- 甲状腺機能障害: TSH FT4 FT3
- 下垂体機能障害・副腎不全: ACTH コルチゾール
- 1型糖尿病: 血糖 HbA1c C-ペプチド
- 大腸炎: 内視鏡検査 造影CT
- 肝障害: エコー 造影CT