

レジメン名	CDDP + GEM
対象疾患名	非小細胞肺癌
1クールの日数	21日
催吐性リスク	高度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食 硫酸Mg	500mL 10mEq	点滴静注	1時間	day 1
2	アクチット フロセミド注	500mL 20mg			
3	アロキシ注 デキサート注	0.75mg 50mL 9.9mg		15分	
4	ブドウ糖 デキサート注	50mL 3.3mg		15分	day 8
5	ブドウ糖 ゲムシタビン(GEM)注	100mL 1000mg/m ²		30分	day 1,8
6	ブドウ糖	50mL		5分	day 8
7	生食	50mL		5分	day 1
8	生食 シスプラチン(CDDP)注	500mL 80mg/m ²		1時間	
9	生食	500mL		1時間	day 1, (2, 3)
10	ソルラクト	500mL		1時間	
11	アクチット	500mL		1時間	
12	アプレピタントCap	125mg 1C	内服	投与前	day 1
13	アプレピタントCap	80mg 1C		投与翌日	day 2, 3
14	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼			day 2-4

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、倦怠感、口内炎、発熱、発熱、発疹、血管痛、骨髄抑制、肝障害、腎障害、浮腫、電解質異常、神経障害(末梢神経障害、聴力障害)

【その他注意事項】

- CDDP: 腎障害予防として、飲水指導を実施(OS-1を推奨)。
- GEM: 点滴時間延長で副作用が増強。