

レジメン名	CBDCA + nab-PTX + キイトルーダ
対象疾患名	非小細胞肺がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食 デキサート注	50mL 6.6mg	点滴静注	5分	day 8, 15
2	グラニセトロン注 デキサート注	1mg 50mL 9.9mg		15分	day 1
3	生食 キイトルーダ注	100mL 200mg		30分	
4	生食	50mL		5分	day 1, 8, 15
5	生食 アブラキサン(nab-PTX)注	100mL 100mg/m ²		30分	
6	ブドウ糖 カルボプラチン(CBDCA)注	250mL AUC = 6		1時間	day 1
7	ブドウ糖	50mL		5分	
8	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼	内服	投与翌日	day 2, 3

【化学療法による主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、脱毛、骨髄抑制、肝障害、発熱、発疹、関節痛・筋肉痛、末梢神経障害、過敏症、皮膚障害

【免疫療法による主な副作用】

間質性肺炎、大腸炎、肝障害、腎障害、皮膚障害、甲状腺機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、重症筋無力症、神経障害、Infusion reaction

【その他注意事項】

- nab-PTX: CYP2E8、3A4阻害薬との併用で作用増強。
- キイトルーダ: 施行前に必要な検査を行う。胸部XP、心電図、造影CT検査も実施する。ルーチンの採血検査 + 以下の検査を1~3ヶ月ごとに施行する。
- 間質性肺炎: KL-6 SP-D 胸部CT
- 甲状腺機能障害: TSH FT4 FT3
- 下垂体機能障害・副腎不全: ACTH コルチゾール
- 1型糖尿病: 血糖 HbA1c C-ペプチド
- 大腸炎: 内視鏡検査 造影CT
- 肝障害: エコー 造影CT