

レジメン名	FOLFIRI + AFL
対象疾患名	大腸がん
1クールの日数	14日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食 デキサート柱	50mL 9.9mg	点滴静注	15分	day 1
2	生食 ザルトラップ(AFL)注	250mL 4mg/kg		1時間	
3	生食	50mL		5分	
4	グラニセトン注	1mg 50mL		15分	
5-a	ブドウ糖 イリノテカン (CPT-11)注	500mL 150mg/m <sup>2</sup>		90分 (bと同時)	
5-b	ブドウ糖 レボホリナート注	250mL 200mg/m <sup>2</sup>		2時間 (aと同時)	
6	ブドウ糖 5-FU注	50mL 400mg/m <sup>2</sup>		5分	
7	生食 5-FU注	適宜 2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 (持続)	46時間	day 1-3

### 【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、色素沈着、骨髄抑制、肝障害、高血圧、蛋白尿、出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、Infusion reaction

### 【その他注意事項】

- 5-FU: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。
- CPT-11: コリン様症状(発汗等)発現時は抗コリン薬(ブスコパン等)の使用考慮。腸閉塞、大量腹水・胸水、黄疸、肺線維症には禁忌。CYP3A4阻害・誘導薬、グレープフルーツジュース、St.ジョーンズワートと薬物相互作用あり。
- AFL: 手術前後は4週間、ポート増設時は2週間空ける。