

| レジメン名 | BEP |
|---------|------|
| 対象疾患名 | 精巣腫瘍 |
| 1クールの日数 | 21日 |
| 催吐性リスク | 高度 |
| その他注意事項 | |

| No | 薬剤名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|----|---------------------|-------------------------------|------|------|----------------|
| 1 | 生食 硫酸Mg | 500mL 10mEq | 点滴静注 | 1時間 | day 1-5 |
| 2 | アロキシ注 デキサート注 | 075mg 50mL 9.9mg | | 15分 | |
| 3 | 生食 ブレオ(BLM)注 | 100mL 30mg | | 30分 | day 1, 8, 15 |
| 4 | 生食 | 50mL | | 5分 | day 1-5, 8, 15 |
| 5 | 生食 シスプラチン(CDDP)注 | 500mL 20mg/m ² | | 1時間 | day 1-5 |
| 6 | アクチット フロセミド注 | 500mL 20mg | | 1時間 | |
| 7 | 生食 エトポシド(VP-16)注 | 500mL 100mg/m ² | | 2時間 | |
| 8 | 生食 | 500mL | | 1時間 | |
| 11 | アプレピタントCap | 125mg 1C | 内服 | 投与前 | day 1 |
| 12 | アプレピタントCap | 80mg 1C | | 投与翌日 | day 2, 3 |

※day 8, 15の前投薬はデキサート6.6mgのみ

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、倦怠感、口内炎、腎障害、浮腫、電解質異常、神経障害(末梢神経障害、聴力障害)、骨髄抑制、肝障害、肺障害、発熱、発疹、血管痛

【その他注意事項】

- BLM: 総投与量は360mg以下とする。
- CDDP: 腎障害予防として、飲水指導を実施(OS-1を推奨)。