

レジメン名	dose dense TC
対象疾患名	卵巣がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ジフェンヒドラミン錠	50mg	内服	投与前	day 1, 8, 15
2	ブドウ糖 デキサート注 ファモチジン注	50mL 9.9mg (※6.6mg) 20mg	点滴静注	15分	day 1 (※day8, 15)
3	グラニセトロン注	1mg 50mL		30分	day 1
4	ブドウ糖 パクリタキセル (PTX)注	500mL 80mg/m ²		1時間	day 1, 8, 15
5	ブドウ糖 カルボプラチン (CBDCA)注	250mL AUC = 6		1時間	day 1
6	ブドウ糖	50mL		5分	
7	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼	内服	投与翌日	day 2, 3

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、脱毛、骨髄抑制、肝障害、関節痛・筋肉痛、末梢神経障害、過敏症、発熱、発疹、末梢神経障害

【その他注意事項】

●PTX:アルコール過敏症は投与不可。CYP2E8、3A4阻害薬との併用で作用増強。