

レジメン名	TC + BV
対象疾患名	卵巣がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ジフェンヒドラミン錠	50mg	内服	投与前	day 1
2	ブドウ糖 デキサート注 ファモチジン注	50mL 9.9mg 20mg	点滴静注	5分	day 1
3	グラニセトロン注	1mg 50mL		30分	
4	ブドウ糖 パクリタキセル(PTX)注	500mL 175mg/m ²		3時間	
5	ブドウ糖 カルボプラチン (CBDCA)注	250mL AUC = 6		1時間	
6	生食	50mL		5分	
7	生食 アバスチン(BV)注	100mL 15mg/kg		初回90分 60分→30分	
8	生食	50mL		5分	
9	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼	内服	投与翌日	day 2, 3

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、脱毛、骨髄抑制、肝障害、関節痛・筋肉痛、末梢神経障害、過敏症、発熱、発疹、末梢神経障害、血管痛、高血圧、蛋白尿、出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、Infusion reaction

【その他注意事項】

- PTX: アルコール過敏症は投与不可。CYP2E8、3A4阻害薬との併用で作用増強。
- BV: 手術前後は4週間、ポート増設時は1週間空ける。