

| レジメン名 | TP |
|---------|-------|
| 対象疾患名 | 子宮頸がん |
| 1クールの日数 | 21日 |
| 催吐性リスク | 高度 |
| その他注意事項 | |

| No | 薬剤名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|----|----------------------------|-------------------------------|------|------|---------|
| 1 | アロキシ注 デキサート注 ファモチジン注 | 50mL 9.9mg 20mg | 点滴静注 | 15分 | day 1 |
| 2 | ブドウ糖 | 50mL | | 30分 | |
| 3 | ブドウ糖 パクリタキセル (PTX)注 | 500mL 175mg/m ² | | 3時間 | |
| 4 | 生食 硫酸Mg | 500mL 10mEq | | 1時間 | |
| 5 | アクチット フロセミド注 | 500mL 20mg | | 1時間 | |
| 6 | 生食 シスプラチン(CDDP)注 | 500mL 50mg/m ² | | 1時間 | |
| 7 | 生食 | 500mL | | 1時間 | |
| 8 | アクチット | 500mL | | 1時間 | |
| 9 | ジフェンヒドラミン錠 | 5錠 | | 内服 | |
| 10 | アプレピタントCap | 125mg 1C | 投与翌日 | | day 2-4 |
| 11 | アプレピタントCap | 80mg 1C | | | |
| 12 | デカドロン錠 | 4mg 2T/朝昼 | | | |

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢・、倦怠感、口内炎、脱毛、骨髄抑制、肝障害、腎障害、浮腫、関節痛・筋肉痛、電解質異常、神経障害(末梢神経障害、聴力障害)、過敏症

【その他注意事項】

- PTX:アルコール過敏症は投与不可。CYP2E8、3A4阻害薬との併用で作用増強。
- CDDP:腎障害予防として、飲水指導を実施(OS-1を推奨)。