

レジメン名	SOX + P-mab
対象疾患名	大腸がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	RAS野生型

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食	50mL	点滴静注	5分	day 1
2	生食 ベクティビックス (P-mab)注	100mL 6mg/kg		1時間	
3	生食	50mL		5分	
4	グラニセトロン注 デキサート注	1mg 50mL 9.9mg		15分	
5	ブドウ糖 エルプラット (L-OHP)注	500mL 130mg/m ²		2時間	
6	ブドウ糖	50mL		5分	
7	エスワンタイホウ (S-1)	※80mg/m ²	内服	(14日分)	day1(夕)-15(朝)

【S-1投与量(処方目安)】

体表面積(m²) 1.25未満 20mg 4錠/日 1.25~1.5未満 25mg 4錠/日
1.5以上 20mg 6錠/日

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、色素沈着、流涙、骨髄抑制、肝障害、末梢神経障害、アレルギー、血管痛(末梢投与の場合)、皮膚障害(皮膚乾燥、ざ瘡様皮疹、爪囲炎、掻痒症)、低Mg血症、Infusion reaction

【その他注意事項】

- S-1: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。
- L-OHP: アレルギーは7~8回目で起こりやすい。
- P-mab: 皮膚症状対策として保湿剤、ステロイド外用剤、ミノマイシンを使用する。