

レジメン名	sLV5FU2 + BV
対象疾患名	大腸がん
1クールの日数	14日
催吐性リスク	軽度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食	50mL	点滴静注	5分	day 1
2	生食 アバステン(BV)注	100mL 5mg/kg		初回90分 60分→30分	
3	生食	50mL		5分	
4	ブドウ糖 デキサート注	100mL 6.6mg		15分	
5	ブドウ糖 レボホリナート注	250mL 200mg/m <sup>2</sup>		2時間	
6	ブドウ糖 5-FU注	50mL 400mg/m <sup>2</sup>		5分	
7	生食 5-FU注	適宜 2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 (持続)	46時間	day 1-3

**【主な副作用】**

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、色素沈着、骨髄抑制、肝障害、高血圧、蛋白尿、出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、Infusion reaction

**【その他注意事項】**

- 5-FU: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。
- BV: 手術前後は4週間、ポート増設時は1週間休薬する。