

レジメン名	CPT-11 + C-mab
対象疾患名	大腸がん
1クールの日数	14日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	RAS野生型

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ジフェンヒドラミン錠	50mg	内服	投与前	day 1, 8
1	生食 デキサート注	50mL 9.9mg	点滴静注	5分	
2	生食 アービタックス (C-mab)注	250-500mL 初回400mg/m ² 2回目～250mg/m ²		初回2時間 2回目～1時間	
3	生食	100mL		30分	
4	グラニセトロン注	1mg 50mL		15分	day 1
5	ブドウ糖 イリノテカン (CPT-11)注	500mL 150mg/m ²		90分	
6	ブドウ糖	50mL		5分	

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、骨髄抑制、口内炎、肝障害、皮膚障害(皮膚乾燥、ざ瘡様皮疹、爪囲炎、掻痒症)、低Mg血症、Infusion reaction

【その他注意事項】

●CPT-11: コリン様症状(発汗等)に注意。抗コリン薬(ブスコパン等)の使用考慮。腸閉塞、大量腹水・胸水、黄疸、肺線維症には禁忌。CYP3A4阻害・誘導薬、グレープフルーツジュース、St.ジョーンズワートと薬物相互作用あり。

●C-mab: 皮膚障害対策として保湿剤、ステロイド外用剤、ミノマイシンを使用する。