

レジメン名	CPT-11 + BV
対象疾患名	大腸がん
1クールの日数	14日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食	50mL	点滴静注	5分	day 1
2	生食 アバスチン(BV)注	100mL 5mg/kg		初回90分 60→30分	
3	生食	50mL		5分	
4	グラニセトロン注 デキサート注	1mg 50mL 9.9mg		15分	
5	ブドウ糖 イリノテカン (CPT-11)注	500mL 150mg/m ²		90分	
6	ブドウ糖	50mL		5分	

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、骨髄抑制、口内炎、肝障害、高血圧、蛋白尿、出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、Infusion reaction

【その他注意事項】

●CPT-11: コリン様症状(発汗等)に注意。抗コリン薬(ブスコパン等)の使用考慮。腸閉塞、大量腹水・胸水、黄疸、肺線維症には禁忌。CYP3A4阻害・誘導薬、グレープフルーツジュース、St.ジョーンズワートと薬物相互作用あり。

●BV: 手術前後は4週間、ポート増設時は1週間空ける。