

レジメン名	SOX + T-mab
対象疾患名	胃がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	HER2陽性

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食 デキサート注	50mL 9.9mg	点滴静注	15分	day 1
2	生食 ハーセプチン (T-mab)注	100mL 初回8mg/kg 2回目～6mg/kg		初回90分 2回目～30分	
3	グラニセトロン注	1mg 50mL		15分	
4	ブドウ糖 エルプラット (L-OHP)注	500mL 100mg/m ²		2時間	
5	ブドウ糖	50mL		5分	
6	エスワンタイホウ (S-1)	※80mg/m ²	内服	(14日分)	day1(夕)-15(朝)

【S-1投与量(処方目安)】

体表面積(m²) : 1.25未満 20mg 4錠/日 1.25～1.5未満 25mg 4錠/日
1.5以上 20mg 6錠/日

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、色素沈着、流涙、骨髄抑制、肝障害、末梢神経障害、アレルギー、血管痛(末梢投与の場合)、心障害、infusion reaction

【その他注意事項】

- S-1: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。
- L-OHP: アレルギーは7～8回目で起こりやすい。
- T-mab: 投与前に心エコー検査行い、LVEFが50%以上か確認する。