

レジメン名	S-1 + PTX(2W2R)
対象疾患名	胃がん
1クールの日数	28日
催吐性リスク	軽度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ジフェンヒドラミン錠	50mg	内服	投与前	day 1, 15
2	ブドウ糖 デキサート注 ファモチジン注	50mL 6.6mg 20mg	点滴静注	15分	
3	ブドウ糖	50mL		30分	
4	ブドウ糖 パクリタキセル (PTX)注	250mL 80mg/m ²		1時間	
5	ブドウ糖	50mL		5分	
6	エスワンタイホウ (S-1)	※80mg/m ²	内服	(14日分)	day1(夕)-15(朝)

【S-1投与量(処方目安)】

体表面積(m²) : 1.25未満 20mg 4錠/日 1.25~1.5未満 25mg 4錠/日
1.5以上 20mg 6錠/日

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、脱毛、骨髄抑制、口内炎、色素沈着、流涙、肝障害、関節痛・筋肉痛、末梢神経障害、爪障害、過敏症

【その他注意事項】

- PTX:アルコール過敏症は投与不可。CYP2E8、3A4阻害薬との併用で作用増強。
- S-1:ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)