

レジメン名	GCS
対象疾患名	胆道がん
1クールの日数	14日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食	500mL	点滴静注	1時間	day 1, 8
2	アロキシ注 デキサート注	0.75mg 50mL 3.3mg		15分	
3	生食 シスプラチン (CDDP)注	500mL 25mg/m ²		1時間	
4	生食	500mL		1時間	
5	ブドウ糖 ゲムシタビン(GEM)注	100mL 1000mg/m ²		30分	
6	ブドウ糖	50mL		5分	
7	アプレピタントCap	125mg 1C	内服	投与前	day 2, 3, 9,10
8	アプレピタントCap	80mg 1C		投与翌日	
10	エスワンタイホウ (S-1)	※80mg/m ²	内服	(14日分)	day1(夕)-8 (朝)

【S-1投与量(処方目安)】

体表面積(m²) : 1.25未満 20mg 4錠/日 1.25~1.5未満 25mg 4錠/日
1.5以上 20mg 6錠/日

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、色素沈着、流涙、骨髄抑制、肝障害、腎障害、発熱、発疹、血管痛、浮腫、電解質異常、神経障害(末梢神経障害、聴力障害)

【その他注意事項】

- CDDP: 腎障害予防として、飲水指導を実施(OS-1を推奨)。
- GEM: 点滴時間延長で副作用増強。
- S-1: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。