

レジメン名	DTX + CBDCA + T-mab
対象疾患名	乳がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食	50mL	点滴静注	5分	day 1
2	生食 ハーセプチン(T-mab)注	250mL 初回8mg/kg 2回目~6mg/kg		初回90分 2回目~30分	
3	アロキシ注 デキサート注	0.75mg 50mL 9.9mg		15分	
4	ブドウ糖 ドセタキセル(DTX)注	250mL 60mg/m ²		1時間	
5	ブドウ糖	50mL		5分	
6	ブドウ糖 カルボプラチン(CBDCA)注	250mL AUC = 6		1時間	
7	ブドウ糖	50mL		5分	
8	アプレピタントCap	125mg 1C	内服	投与前	day 2-3 day 2-4
9	アプレピタントCap	80mg 1C		投与翌日	
10	デカドロン錠	4mg 2T/分2			

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、脱毛、骨髄抑制、肝障害、末梢神経障害、浮腫、爪障害、発熱、発疹、血管痛、心障害、Infusion reaction

【その他注意事項】

●DTX: アゾール系抗真菌薬、エリスロマイシン、クラリスロマイシンと薬物相互作用あり(DTXの作用増強)。

●T-mab: 投与前に心エコー検査行い、LVEFが50%以上か確認する。