

レジメン名	GEM + CBDCA + T-mab
対象疾患名	乳がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食	50mL	点滴静注	5分	day 1
2	生食 ハーセプチン注 (T-mab)	250mL 初回8mg/kg 2回目～6mg/kg		初回90分 2回目～30分	
3	グラニセトロン注 デキサート注	1mg 50mL 9.9mg		15分	day 1, 8
4	ブドウ糖 ゲムシタビン (GEM)注	100mL 1000mg/m ²		30分	
5	ブドウ糖	50mL		5分	
6	ブドウ糖 カルボプラチン (CBDCA)注	250mL AUC = 5		1時間	day 1
7	ブドウ糖	50mL		5分	
8	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼	内服	投与翌日	day 2-3

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、倦怠感、骨髄抑制、肝障害、発熱、発疹、血管痛、心障害、Infusion reaction

【その他注意事項】

●GEM: 点滴時間延長で副作用が増強。

●T-mab: 投与前に心エコー検査行い、LVEFが50%以上か確認する。